

# MEDITEK DOX 500 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

## MEDITEK DOX 500 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

Reg. č.: 96/046/21-C

Léčivá látka: Doxycyclini hyclas 500 mg v 1 g (odpovídá 433,2 mg doxycyclinum)

Pomocná látka: Kyselina citronová

**Charakteristika:** Doxycyklin má široké spektrum účinku, který je několikrát větší ve srovnání s chlortetracyklinem. Působí bakteriostaticky a ve vyšších dávkách bakteriocidně na gram-pozitivní i gram-negativní zárodky, na rickettsie, mykoplasmata a některá protozoa.

**Indikace:** Léčba níže uvedených infekcí způsobených mikroorganismy citlivými k doxycyklinu:

Prasata: atrofická rinitida způsobená *Pasteurella multocida* a *Bordetella bronchiseptica*; bronchopneumonie způsobená *Pasteurella multocida*, *Streptococcus suis*; pleuropneumonie způsobená *Actinobacillus pleuropneumoniae*; kolibacilóza způsobená *Escherichia coli*; glässerova choroba způsobená *Haemophilus parasuis*.

Brojeři kura domácího: infekce respiračního traktu vyvolané *Escherichia coli*, *Bordetella avium* a *Ornithobacterium rhinotracheale*.

**Cílové druhy zvířat:** Prasata, brojeři kura domácího.

**Dávkování:** Perorální podání v pitné vodě.

Prasata:

- 10 mg doxycyklinu hyklátu (20 mg přípravku)/kg ž. hm./den po dobu 3–5 po sobě jdoucích dnů.

Brojeři kura domácího:

- 20 mg doxycyklinu hyklátu (40 mg přípravku)/kg ž. hm./den po dobu 3–4 po sobě jdoucích dnů v případě infekce způsobené *O. rhinotracheale*.
- 25 mg doxycyklinu hyklátu (50 mg přípravku)/kg ž. hm./den po dobu 3–5 po sobě jdoucích dnů v případě infekcí způsobených *E. coli* a *B. avium*.

**Ochranná lhůta:** maso prasat a brojlerů kura domácího 7 dnů. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

**Balení:** 0,5 kg, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg

**Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.**

**Uvedené informace o přípravcích nemusí být zcela aktuální! Pro aktuální a úplné znění souhrnů údajů o přípravcích (SPC) prosím navštivte webové stránky ÚSKVBL. [odkaz ZDE](#)**